

TEARS NATURALE® II

(Umělé slzy)

Sterilní oční kapky

VÝROBCE

ALCON-COUVREUR n.v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie.

SLOŽENÍ

Účinná látka:

Dextranum 70 1,0 mg a Hydroxypropylmethylcellulosum 3,0 mg v 1 ml roztoku (20 kapek).

Konzervační látka:

POLYQUAD™ (Polyquadii chloridum) 0,01 mg v 1 ml roztoku (20 kapek).

Pomocné látky:

Natrii chloridum, Natrii tetraboras decahydricus, Kalii chloridum, Natrii hydroxidum, Acidum hydrochloricum 35 %, Aqua purificata.

INDIKAČNÍ SKUPINA

Oftalmologikum, umělé slzy.

CHARAKTERISTIKA

Vaše slzy jsou pozoruhodná tekutina.

A mají velmi důležitou funkci. Slzy obsahují přesné množství přírodních složek, které se mísí aby vytvořily ochrannou vrstvu na povrchu oka, zvanou slzný film. Slzný film chrání a zvlhčuje Vaše oči každý den a pomáhá je udržovat v pohodlí a zdraví.

Ale někteří lidé mají příliš málo normálních slz.

Mnoho lidí produkuje buď příliš málo slz a nebo slzy, které postrádají některou důležitou složku. Nedostatek slz nebo slzy, které neobsahují vše, co potřebují ke splnění svého úkolu, může způsobit rozrušení slzného filmu a formování suchých míst na rohovce. Tak vznikají příznaky suchých a citlivých očí - pocit písku v očích, podráždění a pálení očí, únava očí a celkové nepohodlí. Suché oko může být překvapivě někdy příčinou nadměrného slzení v pokusu udržet povrch oka mokré, ale tyto slzy postrádají potřebné komponenty, takže problém přetrvává dále.

Problém suchého oka převážně postihuje dospělé v pozdějším věku, hlavně ženy. Čím je člověk starší, tím méně tekutin, včetně slz, jeho tělo produkuje. Příčinou je také vnější prostředí, suchý vzduch, smog, kouř a vítr, které mohou zhoršit dané podmínky. Problémy se slzným filmem mohou také způsobit časté alergie, nedostatek vitamínů a artritida.


INDIKACE

Jako dočasná úleva při pálení a podráždění oka, způsobeném suchostí oka, a jako ochrana proti dalšímu podráždění. Jako dočasná úleva při nepohodlí, způsobeném podrážděním nebo vystavením oka slunci či větru.


KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek, pokud jste přecitlivělí na některou jeho složku.

SUCHÁ
MÍSTA
POVRCH
OKA
SLZNÝ
FILM



NAHRAZENÝ
SLZNÝ FILM



NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve výjimečných případech se může objevit místní podráždění po aplikaci. Zřídka se může vyskytnout lokální přecitlivělost.

INTERAKCE

Nejsou známy.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Vkápnete 1 nebo 2 kapky do spojivkového vaku postiženého oka (oči) podle potřeby. Přípravky mohou používat dospělí, děti, těhotné i kojící ženy.

TEARS NATURALE® II jsou uzpůsobeny tak, aby umožnily podávání léku po jednotlivých kapkách a zároveň, aby zbylý roztok zůstal sterilní. K dosažení nejlepších výsledků dodržujte následujících 5 kroků:

1. Odstraňte z uzávěru umělohmotnou folii, pak odšroubujte uzávěr.
2. Konečky prstů stáhněte dolní víčko (máte-li možnost, použijte zrcadlo).
3. Podržte dávkovač těsně vedle nosu. **Nedotýkejte se konce dávkovače ani se jím nedotýkejte oka.**
4. Jemně zmáčkněte lahvičku, vkápnete 1 nebo 2 kapky do spojivkového vaku vytvořeného stažením víčka. Pomalu víčko pouštějte.
V případě, že musíte mít brýle do blízka, můžete podržet dávkovač u vnějšího koutku oka a kapat kapky do oka výše uvedeným způsobem při nasazených brýlích.
5. Po použití lahvičku opět uzavřete.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže pociťujete bolest oka, změny vidění, přetrvávající zčervenání nebo podráždění, a nebo pokud obtíže, pro které byl přípravek nasazen, přetrvávají déle než 72 hodin, nebo se dokonce zhorší, přerušete používání přípravku a navštívte lékaře. Váš oční lékař by měl být informován o tom, že používáte TEARS NATURALE II při předepisování jiných očních léků.

Současně s používáním přípravku můžete nosit všechny druhy měkkých kontaktních čoček.

Těsně po nakapání přípravku se může objevit rozostřené vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových vozidel nebo ovládání strojů. Proto tyto činnosti vykonávejte nejdříve půl hodiny po použití přípravku. Přípravek neovlivňuje účinnost ani vstřebávání jiných očních léků. Mezi aplikací přípravku a jiných očních kapek nebo mastí však dodržujte alespoň 5-ti minutový interval, aby nedošlo k vyplavení již aplikované účinné látky.

Nepoužívejte, pokud roztok změnil barvu nebo se zakalil.

Aby nedošlo ke kontaminaci přípravku nesmí se ústí lahvičky dotknout oka ani tkáně či předmětů.

Po otevření lahvičky smí být přípravek používán pouze po dobu 4 týdnů.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25°C. Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní při 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Po každém použití lahvičku dobře uzavřete.

Při náhodném požití přípravku, hlavně dítětem, se poradte s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ

Při obvyčejné teplotě.

VAROVÁNÍ

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

BALENÍ

15 ml sterilních očních kapek v umělohmotné kapací lahvičce Drop-Tainer®, příbalová informace, papírová skládáčka.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: Říjen 1999



Alcon®